

CHECKLISTA FÖR SVÄLJNINGSSCREENING PÅ CVS-PATIENT TILL YRKESPERSONER INOM HÄLSOVÅRDEN

- Ta reda på vilken praxis som gäller för sväljningsscreening i din organisation.
- Förbind dig till vald evidensbaserad screeningspraxis.
- Se till att du får utbildning i sväljningsscreening så att du kan utföra den på korrekt sätt.
- Gör en sväljningsscreening på CVS-patienten genast vid intagning och innan du ger något per os och kontrollera patientens vakenhetstillstånd och medvetandenivå* före screeningen.
- Om patienten konstateras ha sväljningssvårigheter gör en sväljningsscreening på CVS-patienten dagligen i akutskedet i kombination med behandlingen av feber och blodsocker.
- Sköt om CVS-patientens intensifierade munhygien, rengör mun och övre svalget före sväljningsscreeningen för att undvika aspiration av bakterieflora.
- Om det efter sväljningsscreeningen uppstår misstankar om bristfällig sväljning i samband med intag av måltider eller om patientens sväljningssvårigheter ökar, be talterapeuten göra en bedömning.
- Sköt om bedömningen av risken för undernäring med hjälp av tillgänglig riskmätare och konsultera näringsterapeuten vid behov.
- Kontrollera dagligen CVS-patientens vakenhetstillstånd och medvetandenivå, hur sväljningen lyckas, ansiktets symmetri, röstkvaliteten och förändringar i den, tungans rörelser och om patienten hostar i samband med sväljning. Om du upptäcker sväljningssvårigheter mät syresaturationen före och efter vattensväljningstestet.

*GCS utbildningsvideo: <https://terveyskyla.flowboard.fi/videos/MWBG9CEF4S/video.mp4>